



Rede • 2000 •
Natura



Mamífero



Insectos



Hyacinthoides vicentina



Árvores e arbustos



2000

Feede



Ervas tenras, essencialmente gramíneas



Cinco



Azuis ou purpúreas



Sobreiro



2000

Feede



13 centímetros



Ecolocação



Primavera



Bolota



•2000•

Feede



3 anos



Mamíferos



Ovelhas, cabras e vacas



Quercus



Feede • 2000 •



Entre 45 a 70 gramas



Durante a noite



55 centímetros



500 anos



2000

Feede



Microtus cabrerae



Castanhos e/ou pretos



Duas



Quercus suber



Rede • 2000 •



11 ratinhos



Cerca de 1100 espécies



Sul de Portugal



Quercus rotundifolia



2000

Rede



Pêlos



30 anos



Bolbo



Carvalho-negral



2000

Seede



Do leite materno



Morcegos cavernícolas



Para armazenar os alimentos



Madeira, cortiça e bolotas



Rede • 2000 •



Sim



Morcegos arborícolas



Uma planta



Sobreiros e azinheiras



Feede • 2000 •



Sim



Raposas voadoras



Sim



Porco



2000

Rede



Coruja-das-torres



O ouvido



Locais com alguma humidade



De nove em nove



2000

Rede



Crepusculares



De cabeça para baixo



Reino das Plantas



O sobreiro



2000

Rede



Túneis



Uma



Endemismo lusitano



Pelas raízes



2000

Rede



Duas



Pêlos



Ameaças



15 anos



2000

Seede



Ervas altas e arbustos



Do leite materno



Forma de campânula



Água, luz e sais minerais



Rede • 2000 •



Diminui a sua actividade



Mais de 15



No Verão



Montado de sobro



Rede • 2000 •



Sim, crescem durante toda a vida



Insectos



Dois a seis meses



Carvalho-negral



2000

Seede



16 dentes



Fertilização de terras



Início do Outono



Seis



•2000•

Feede



Castanho-amarelado



A boca e o nariz em forma de ferradura



Abril/Maio (Primavera)



O sobreiro dá cortiça e a azinheira não



Rede • 2000 •



Rata-de-água



Sim



Sim



A azinheira



•2000•

Feede



23 dias



Colónia de morcegos



A partir do bolbo



Carvalho-cerquinho ou
carvalho-português



•2000•

Rede



Península Ibérica
(Portugal e Espanha)



Entre Abril e Junho
(dependendo da espécie)



Estado de dormência



Aparece um bugalho



2000

Rede



Para evitar predadores que aí se costumam abrigar



Frugíveros



Agrupadas, em forma de cacho



Um ninho de vespa



Feede • 2000 •



Sim



Sim



Cebola-albarrã
(nome latim: *Scilla monophyllus*)



Carvalho-negral